

MSI-Highを有する固形がん

ペムブロリズマブ単独療法

		Day	1	8	15
ペムブロリズマブ	200mg 点滴静注	30分	●		

21日ごとにくりかえす
PD(増悪)まで

がん化学療法後に増悪した進行・再発の高頻度マイクロサテライト不安定性(MSI-High)を有する固形癌(標準的な治療が困難な場合に限る)

制吐療法などの前投薬

—

投与基準

副作用による減量基準

—

肝機能による減量基準

—

腎機能による減量基準

—

MSI-Highを有する固形がん

ペムブロリズマブ単独療法

		Day	1	8	15
ペムブロリズマブ	400mg 点滴静注	30分	●		

6週(42日)ごとにくりかえす
PD(増悪)まで

がん化学療法後に増悪した進行・再発の高頻度マイクロサテライト不安定性(MSI-High)を有する固形癌(標準的な治療が困難な場合に限る)

制吐療法などの前投薬

—

投与基準

副作用による減量基準

—

肝機能による減量基準

—

腎機能による減量基準

—

MSI-Highを有する結腸・直腸がん ニボルマブ単独療法

			Day	1	8	15
ニボルマブ	240mg 点滴静注	30分以上		●		●

14日ごとにくりかえす
PD(増悪)まで

4週ごとに480mgを投与することもできる

がん化学療法後に増悪した治癒切除不能な進行・再発の
高頻度マイクロサテライト不安定性(MSI-High)を有する結腸・直腸癌

制吐療法などの前投薬

ポラミン 5mg 静脈内投与(2回目以降は省略可能)

投与基準

副作用による減量基準

—

肝機能による減量基準

—

腎機能による減量基準

—