

軟部腫瘍

ドキシソルビシン単独療法

	Day	1	8	15	21
ドキシソルビシン 75mg/m ² 点滴静注 15分		●			

21日ごとにくりかえす

累積投与量が 500mg/m² を超えないこと

1次治療

制吐療法

5-HT₃受容体拮抗剤＋デキサメタゾン

投与基準

副作用による減量基準

肝機能による減量基準

ドキシソルビシン 総ビリルビン 1.5～3.0 or AST 60～180 50%減量
総ビリルビン 3.1～5.0 or AST > 180 75%減量
総ビリルビン > 5.0 中止

腎機能による減量基準

軟部腫瘍

エリブリン単独療法

			Day	1	8	15	21
エリブリン	1.4mg/m ² 静注	2~5分		●	●		

21日ごとにくりかえす

2次治療以降

制吐療法などの前投薬
デキサメタゾン

投与基準

好中球数 $\geq 1000/\text{mm}^3$
血小板数 $\geq 75,000/\text{mm}^3$
非血液毒性: Grade2以下

副作用による減量基準
添付文書参照

肝機能による減量基準

Child-Pugh	A	1.1mg/m ²
	B	0.7mg/m ²
	C	-

腎機能による減量基準

Ccr(mL/min)	> 50	1.4mg/m ²
	30~50	1.1mg/m ²
	< 30	-